

Läkemedelshantering - Kortisonparaply - Röntgen Gävleborg

Elektiva fall:

Tablett Prednisolon

≥ 6 år 50 mg,
barn < 6 år 30 mg

*alternativt***Tablett Betapred**

≥ 6 år 5 mg
Barn < 6 år 3 mg

OCH**Tablett Aeries**

≥12 år 10 mg
6-12 år 5 mg
barn < 6 år 2,5 mg

eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos 12 och 2 timmar före kontrastmedelsinjektion

D.v.s. Prednisolon eller Betapred + Aeries tas 12 timmar och 2 timmar före kontrastmedelsinjektion

Akuta fall:

Solu-Cortef i.v. omedelbart och sedan var 4:e timme fram till undersökningen (över 6 år 250 mg, barn yngre än 6 år 100 mg)

Undersökningen kan utföras efter den första injektionen av Solu-Cortef. Att det står "och sedan för 4:e timme fram till undersökningen" är bara för att fylla på Solu-Cortef som har en relativt snabb halveringstid. Se FASS för mer info.

alternativt

Betapred i.v. (över 6 år 8 mg, barn yngre än 6 år 4 mg)

OCH

1 timme före undersökningen ges tablett Aeries

(över 12 år 10 mg, 6-12 år 5 mg, barn yngre än 6 år 2,5 mg)

eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos 1 timme före undersökningen

Kontrollera att syrgas/sug fungerar och att akutbricka/vagn/väska finns tillgänglig.