

## Läkemedelshantering - Kortisonparaply - Röntgen Gävleborg

### Elektiva fall:

**Tablett Prednisolon**

≥ 6 år 50 mg,  
barn < 6 år 30 mg

*alternativt***Tablett Betapred**

≥ 6 år 5 mg  
Barn < 6 år 3 mg

**OCH****Tablett Aeries**

≥12 år 10 mg  
6-12 år 5 mg  
barn < 6 år 2,5 mg

eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos 12 och 2 timmar före kontrastmedelsinjektion

**D.v.s. Prednisolon eller Betapred + Aeries tas 12 timmar och 2 timmar före kontrastmedelsinjektion**

### Akuta fall:

**Solu-Cortef i.v. omedelbart** och sedan var 4:e timme fram till undersökningen (över 6 år 250 mg, barn yngre än 6 år 100 mg)

*Undersökningen kan utföras efter den första injektionen av Solu-Cortef. Att det står "och sedan för 4:e timme fram till undersökningen" är bara för att fylla på Solu-Cortef som har en relativt snabb halveringstid. Se FASS för mer info.*

*alternativt*

*Betapred i.v. (över 6 år 8 mg, barn yngre än 6 år 4 mg)*

**OCH**

**1 timme före undersökningen ges tablett Aeries**

(över 12 år 10 mg, 6-12 år 5 mg, barn yngre än 6 år 2,5 mg)

eller annat icke sederande antihistamin i dubbel dos 1 timme före undersökningen

*Kontrollera att syrgas/sug fungerar och att akutbricka/vagn/väska finns tillgänglig.*