


Provtagningsanvisning Triglycerid och Kolesterol i övriga kroppsvätskor - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg (skriv för hand under övriga analyser)
Provtagning	Li-Heparinrör utan gel, mörkgrön propp 
Förvaring/Transport	Transport till analyserande lab samma dag. Provet centrifugeras på Klinisk kemi före analys. Centrifugerat prov hållbart 2 dygn i rumstemperatur 7 dygn i kyl 3 månader i frys -20 °C
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall
Referensintervall	Referensintervall för Triglycerid och Kolesterol i diverse vätskor saknas.
Svarstid	Dagligen
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Vid misstanke om malignitetssuspekta förändringar, kylotorax samt kylomikroner i ascites. Diagnostiska kriterier för kylothorax: Triglycerid > 1,24 mmol/L och Kolesterol < 5,2 mmol/L

	<p>Diagnostiska kriterier för pseudokylotorax: Triglycerid < 0,56 mmol/L och Kolesterol > 5,2 mmol/L.</p> <p>Kylus i ascites: Triglycerid > 2,25 mmol/L En koncentration som vanligtvis är större än motsvarande plasmakoncentration är i de flesta fall sekundär till en malign process. Kolesterolhalterna kan vara högre hos patienter med maligna tillstånd.</p>
--	---

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	8	Lagt till rubriken revideringar.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet