






Krossbarhet slutenvårdssortiment - Beskrivning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Följande tabell ger krossnings- och sondinformation för läkemedel i Region Gävleborgs sortiment för slutenvårdssdos - använd dock i första hand källor som lakemedelshantering.se, som ger utförligare information. En lathund över krossbara läkemedel, att använda i det dagliga arbetet finns här: [Lathund kross- och öppningsbara läkemedel](#). Observera att sortimentet kan ha ändrats sedan listan senast uppdaterades och att dessa listors målgrupp främst är läkare i Region Gävleborgs verksamheter.

Tabellen ger information i tre kolumner; "Kross" som beskriver om tabletten kan krossas/lösas upp eller kapseln kan öppnas, "Sond" om den tillgängliga beredningsformen kan administreras i sond, och "Alternativ" som visar om läkemedlet finns i andra beredningsformer som kan användas istället. Alternativa beredningsformer omfattar ej andra liknande substanser, som i vissa fall kan vara lämpliga. Alternativa beredningsformer kan hittas via ATC-register på Fass.se och via substans på vara.ehalsomyndigheten.se/vara-web/

Färgschemat är valt för att fungera även vid nedsatt färgseende.

 = ja  = nej  = se kommentaren för guidning  = kapseln kan öppnas
 * = annan beredningsform finns, men på licens, som extemporeberedning, eller på rekvisition)

Informationen nedan är hämtad från angivna referenser, samt i vissa fall korrespondens med företag. I några fall där specifik information saknas, har en farmaceutisk bedömning gjorts - men observera att krossning samt sond-administrering av tabletter och kapslar ofta faller under off label-användning. Testerna till grund för rekommendation i källorna, är i flera fall gjorda på andra märken än de i slutenvårdssdosens sortiment, men räknas då gälla alla generika om ej annat anges. Vid frågor om tabellens innehåll och källor, eller upptäckta fel, kontakta lakemedelsenheten@regiongavleborg.se eller Läkemedelsenhetens kliniska farmaceuter via telefon.

Generellt om krossbarhet och läkemedel i sond

När det är möjligt, är det bättre att lösa upp läkemedlet än att krossa, då det innebär mindre spridning av substans till personal samt mindre risk för förlorad dos. För att inte utsätta personal för kontaminationsrisk, byt gärna till andra beredningsformer av antibiotika (uppmärksatta i tabellen som [antibiotika](#).)

Sondens storlek har betydelse. PEG innebär lägre risk för ocklusion, smala sonder (storlek < 8) innebär högre risk, särskilt med filmdragerade tabletter. Uppmärksamma att vid ofullständig krossning kan bitar av dragering leda till stopp i tunn sond.

Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Absenor	Enterotablett				
Aciclovir	Tablett				
Akineton	Tablett				Företaget kan ej rekommendera krossning eller sond. Är dock vanlig tablett.
Alendronat Veckotablett	Tablett				Får inte krossas i munnen. Bäst att avstå om ej permanent sond. Ej till liggande patient.
Alfacalcidol/Etalpa	Kapsel				Kan tuggas.
Alfakil/Doxazosin	Depottablett				
Alfuzosin	Depottablett				
Alimemazin	Kapsel				Innehållet kan strös på mat eller blandas i vatten. Inga studier på sond.
Allopurinol	Tablett				Svårlöst.
Alprazolam	Depottablett				
Alvedon	Tablett				Filmdragerad.
Amlodipine	Tablett			*	Ges omgående efter uppslamning.
Anafranil Retard	Depottablett				
Aripiprazole	Tablett				Vid krossning av tablett finns en risk för kontaktsensibilisering, se läkemedelshantering.se
Asacol	Enterotablett				
Atarax	Tablett				Filmdragerad, smakar illa.
Atenolol	Tablett			*	Risk för ocklusion i smal sond.
Atorvastatin	Tablett				Risk för ocklusion i smal sond.
Bactrim (+forte)	Tablett				Antibiotika. Krossas ej. Kan slammas upp i vatten för omedelbar administrering.

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg 3(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Baklofen	Tablett			*	Bör tas i samband med måltid/sondmat eller med ett glas mjölk.
Betmiga	Depottablett				
Betolvex	Tablett				Filmdragerad.
Beviplex forte	Tablett				Enligt företagets bedömning (dock ej testat).
Bezalip	Tablett				Filmdragerad, smakar illa. Sväller/löses upp i vatten.
Bicalutamide	Tablett				Smakar illa. Kan ge fosterskador, tabletter bör därför inte krossas av de som kan vara gravida.
Bisoprolol	Tablett				Filmdragerad, smakar illa.
Brilique	Tablett				Filmdragerad.
Brintellix	Tablett			*	Filmdragerad. Ges i sond omgående efter uppslamning.
Bupropion/Voxra	Modifierad frisättning-tablett				
Burinex	Tablett				
Buspiron	Tablett				Information saknas. Enl. farmaceutisk bedömning bör gå att krossa och ge i sond, men är ej testat.
Campral	Enterotablett				
Candesartan	Tablett				
Candesartan + hydroklortiazid	Tablett				
Carvedilol	Tablett				
Cetirizin	Tablett				Smakar illa, något svårlöst.
Ciprofloxacin	Tablett				Antibiotika. Ej med sondmat.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar

Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Circadin	Depottablett				
Cisordinol	Tablett				Filmdragerad, smakar illa. Bör enligt farmaceutisk bedömning gå att ge i sond, men är ej testat
Citalopram	Tablett			*	Svårlöst, risk för ocklusion i smal sond.
Citodon	Tablett				
Clopidogrel	Tablett				
Clozapine	Tablett				
Concerta	Depottablett				
Cordarone	Tablett				Smakar illa. Bör kunna gå i sond. Ok att missa enstaka doser pga. lång halveringstid.
Creon 25000	Kapsel				Innehållet kan blandas med sur dryck, får ej krossas. Kan ges i sond i vissa fall, följ protokoll i Bilaga 1. Behöver inte alltid ges under sondmatning, konsultera dietist.
Cyklokapron	Tablett				Filmdragerad. Generellt ok i sond, men ej studerat.
Dalacin	Kapsel				Antibiotika. Kan öppnas och ges i sond, men ej i mun pga. risk för frätskador esofagus.
Desloratadine	Tablett				
Dexametason	Tablett			*	
Digoxin	Tablett				Krossning ökar absorptionen.
Dimetikon	Kapsel				Kan tuggas.
Divisun	Tablett				Generellt ok i sond, men ej studerat.
Dolcontin	Depottablett				
Donepezil	Tablett				Filmdragerad.
Doxyferm	Tablett				Antibiotika. Ska ej krossas, kan slammas upp och drickas eller sondadministreras. Svårlös, kan behöva stå 5 minuter. Bör ges med måltid.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar

Duloxetin	Kapsel				Innehållet kan blandas med sur dryck och drickas.
Duroferon	Depottablett				
Daxas	Tablett				Filmdragerad
Eliquis	Tablett				
Elvanse	Kapsel				Kan slammas upp i vatten. Ingen data finns för sond, men har getts i sond (i RG) utan passageproblem. Dock oklart om biotillgängligheten påverkas. Överväg gärna alternativ, eller tillfälligt uppehåll i medicineringen om möjligt
Emgesan/ magnesium	Tablett				Generellt ok i sond. Alternativ = andra magnesiumsalt.
Enalapril	Tablett			*	Filmdragerad.
Enalapril Comp	Tablett				Smakar illa. Bör kunna gå i sond.
Entocort	Depotkapsel				Ska inte krossas eller tuggas. Innehållet kan slammas upp i vatten och ges peroralt eller i sond. Ej i mycket smal sond.
Epanutin	Kapsel				Oklart om kan ges i mun. Kapselns innehåll töms i vatten och får stå 5 minuter för att sedan röras om innan sondadministrering. Interagerar med sondmat. Både licens- och godkända alternativ.
Eplerenon	Tablett				Filmdragerad.
Equasym Depot	Modifierad frisättning-kapsel				Innehållet kan strös över t.ex. äppelmos för peroral administrering.
Ergenyl Retard	Depottablett				
Escitalopram	Tablett				Slammas upp. Svårslöslig. Ges omedelbart.
Esomeprazol	Enterokapsel				För sond, se lakemedelshantering.se. Märken kan ha olika kornstorlek, ges i sond med försiktighet
Etalpa	Kapsel				
Etoricoxib	Tablett				Filmdragerad. Löses upp och ges omedelbart.
Ezetimib	Tablett				Löses i vatten.
Felodipin	Depottablett				

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg 6(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Finasteride	Tablett				Filmdragerad. Substansen kan ge fosterskador, bör därför inte krossas av de som kan vara gravida.
-------------	---------	--	--	--	---

Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Flagyl	Tablett				Antibiotika. Uppehåll med enteral nutrition 1 tim. rekommenderas före administrering i sond.
Fluanxol	Tablett				Filmdragerad, smakar illa. Enl. farm. bedömning bör gå att krossa och ge i sond, men info saknas.
Fluconazol	Kapsel				Smakar illa. Använd helst 50mg-kapseln i sond.
Fluoxetin	Kapsel				Smakar illa.
Folsyra	Tablett				Enligt farmaceutisk bedömning bör gå att ge i sond, men är ej testat.
Forxiga	Tablett				Filmdragerad. Försiktighet vid hantering, se lakemedelshantering.se.
Furix	Tablett				
Gabapentin	Kapsel			*	Smakar illa
Galantamin	Depotkapsel				Kapseln kan öppnas. Innehållet bestå av depotkorn som inte ska krossas. Bör tas på morgonen i samband med måltid
Haldol	Tablett				Slammas upp (ej krossas) för omedelbar administrering i sond.
Heminevrin	Kapsel				Heminevrin oral lösning kan adsorberas i slangar av plast.
Hiprex	Tablett				Generellt ok i sond, men ej studerat.
Hydroklortiazid	Tablett				
Hydrokortison/Kortifarm	Tablett				
Ibumetin	Tablett				Kan ge svalgirritation om det ges i munnen.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Idotrim	Tablett				Antibiotika.

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg 7(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Iktorivil	Tablett			*	
Imdur	Depottablett				
Imovane	Tablett				Smakar illa. Generellt ok i sond, men ej studerat.
Inderal	Tablett				
Irbesartan	Tablett				Filmdragerad
Ismo/Isosorbidmononitrat	Tablett				
Isomex	Depottablett				
Isoptin	Tablett			*	Filmdragerad, smakar illa.
Januvia	Tablett				Filmdragerad.
Jardiance	Tablett				Filmdragerad. Försiktighet vid hantering, se lakemedelshantering.se.
Kalcipos	Tablett				Filmdragerad. Generellt ok i sond, men ej studerat. Alternativ kan föredras.
Kalcipos-D (+ forte)	Tablett				Filmdragerad. Generellt ok i sond, men ej studerat. Alternativ kan föredras.
Kaleorid	Depottablett				
Keppra	Tablett				Filmdragerad
Kortifarm	Tablett				
Lamotrigin	Tablett				Använd löslig tablett i sond (löses, ej krossas). Vanlig tablett kan ej krossas enligt tillverkare.
Lasix Retard	Depotkapsel				
Lergigan(+ forte)/Prometazin	Tablett				Filmdragerad. Generellt ok i sond, inga studier för exakt svar.
Lerkanidipin	Tablett				Filmdragerad. Kan delas för att underlätta nedsväljning.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Letrozol	Tablett				Om krossning nödvändig, var försiktig för spridning av substans och förlorad dos.

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdssortiment - Beskrivning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg 8(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Levaxin	Tablett				Kan adsorberas till sond. Gör uppehåll i enteral nutrition 1 tim. före eller efter administrering av levotyroxin i sond om pat. har sond i över 7 dagar pga. interaktion med enteral nutrition.
Levetiracetam	Tablett				
Levofloxacin	Tablett				Antibiotika. Svårlöst.
Levomepromazin	Tablett			*	Risk för ocklusion i smal sond.
Lithionit	Depottablett			*	
Lixiana	Tablett				Filmdragerad.
Loperamid	Kapsel				
Loratadin	Tablett				I första hand rekommenderas oral lösning, utspädd, i sond.
Losartan	Tablett			*	Filmdragerad, smakar illa.
Losartan + Hydroklortiazid	Tablett				Filmdragerad, smakar illa.
Lyrica	Kapsel				
Madopark	Tablett				Absorptionen kan försämras av högt proteininnehåll i sondmat.
Madopark Depot	Depotkapsel				
Madopark Quick (+ mite)	Tablett				Slammas upp. Rör om före administrering då sedimentering sker snabbt. Absorptionen kan försämras av högt proteininnehåll i sondmat.
Medikinet	Modifierad frisättning-kapsel				Innehållet kan blandas med kall mat.
Melatonin AGB	Tablett				
Memantine	Tablett				Filmdragerad.
Metadon	Tablett				Bör gå att krossa, ingen information om sond.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Metformin	Tablett			*	Filmdragerad, smakar illa. Ges i samband med mat/sondmat.

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg 9(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Metoclopramide/Primperan	Tablett			*	
Metolazon	Tablett				
Metoprolol	Depottablett				Sandoz: Kan slammas upp i vatten, och drickas, men ej tuggas/krossas. Kan delas.
Mianserin	Tablett				Filmdragerad, Smakar illa.
Midodrin	Tablett				
Mirtazapin	Tablett				Smakar illa.
Montelukast	Tablett				Granulat går ej i sond, övriga beredningsformer går bra.
Morfin	Tablett				Generellt ok i sond, men ej studerat.
Naltrexone	Tablett			*	Mycket bitter smak. Bör gå att ge i sond.
Natriumbikarbonat	Tablett				Generellt ok i sond, men ej studerat. Möjlighet till inj-behandling är dosberoende, se Bilaga 1.
Natriumklorid	Tablett				Bör gå att krossa, ingen information om sond.
Niferex	Enterokapsel				Får ej tuggas
Nimotop	Tablett				Ljuskänslig, administrera inom 10 minuter.
Nitrofurantoin	Tablett				Antibiotika . Bör tas tillsammans med mat.
Normorix (+ mite)	Tablett				
Olanzapin	Tablett				Risk för ocklusion i smal sond.
Omeprazol	Enterokapsel				Kapselns innehåll kan blandas med sur dryck. Kan med särskild hantering ges i sond, se Bilaga 1.
Ondansetron	Tablett				Filmdragerad.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Oxascand	Tablett				

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg 10(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

OxyContin	Depottablett				
OxyNorm	Kapsel				Innehållet kan läggas i sked eller slammas upp. Kan adsorberas till sond.
Pantoprazol	Enterotablett				
Paraflex	Tablett				Generellt ok i sond men inga studier finns. Ges helst med mat (magretande).
Paroxetin	Tablett			*	Filmdragerad.
Postafen	Tablett				
Pramipexol/Sifrol	Tablett				
Prasugrel	Tablett				Filmdragerad. Krossad tablett har en bitter smak och kan blandas med mat eller dryck. För administrering i sond, se läkemedelshantering.se
Pravastatin	Tablett				Ges till natten. Om sondmat går över natten, ge på morgonen.
Prednisolon	Tablett				
Pregabalin	Kapsel				
Primperan/Metoclopramide	Tablett			*	
Propavan	Tablett				
Quetiapin	Tablett				Filmdragerad, smakar illa.
Quetiapin Depot	Depottablett				
Ramipril	Tablett				
Rimactan	Kapsel				Antibiotika. Bör ej öppnas pga. risk för kontaktsensitivering. Om öppning ändå krävs, dragskåp.
Risperidon	Tablett				Filmdragerad.
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Ritalin	Modifierad frisättning-kapsel				Innehållet kan blandas med liten mängd kall mat, intas omedelbart.

Rosuvastatin	Tablett				Ges omgående efter uppslamning.
Salazopyrin EN	Enterotablett				Vanlig tablett kan krossas men irriterar magslemhinnor.
Salures	Tablett				Svårlöst.
Saroten	Tablett			*	Smakar illa. Ges omgående efter uppslamning.
Seloken	Tablett				Tillsammans med föda ökar biotillgängligheten med 40%.
Sertralin/Sertrone	Tablett				Filmdragerad.
Simvastatin	Tablett				Filmdragerad, svårlöst. Överväg Atorvastatin.
Solifenacin/Vesicare	Tablett				Filmdragerad. Information saknas. Enl. farmaceutisk bedömning bör gå att krossa och ge i sond, men är ej testat. Finns även som oral lösning.
Spironolakton	Tablett				Ges omgående efter uppslamning. Substansen kan ge fosterskador, tabletter bör därför inte krossas av gravida.
Sotalol	Tablett			*	
Stesolid	Tablett				
Synjardy	Tablett				Filmdragerad. Kvinnor som är gravida bör ej hantera empagliflozin på grund av otillräcklig dokumentation avseende fosterskadande egenskaper.
Tamiflu	Kapsel				Smakar illa. Innehåll kan blandas i söt mat.
Targiniq	Depottablett				
Tavegyl	Tablett			*	Ljuskänslig, administrera inom 10 minuter.
Tegretol	Tablett				Kan adsorberas till sond (följ upp koncentration).
Tegretol Retard	Depottablett				
Thacapzol	Tablett				Ska inte krossas. Kan slammas upp i i lite vatten precis innan administreringen
Läkemedel	Beredningsform	Kross	Sond	Alternativ	Kommentar
Tibinide	Tablett			*	Antibiotika. Generellt ok i sond, inga studier för exakt svar.

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdsdossortiment - Beskrivning - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg 12(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Tolterodin/ Detrusitol	Tablett				Filmdragerad
Tolterodin	Depotkapsel				
Topimax	Tablett				Filmdragerad, smakar illa. Substansen kan ge fosterskador, tabletter bör därför inte krossas av de som kan vara gravida.
Trajenta	Tablett				Filmdragerad.
Tramadol	Kapsel				Vid sond föredras andra beredningsformer.
Trombyl	Tablett				Ges omgående efter uppslamning, pga. snabb hydrolysering.
Truxal	Tablett				Filmdragerad, smakar illa. Bör enligt farmaceutisk bedömning gå att ge i sond, men är ej testat.
Ursofalk	Kapsel				Kan ges på mat.
Valaciclovir	Tablett				Mycket svåra att krossa/lösa, hydrolyseras snabbt. Överväg Aciklovir.
Valsartan	Tablett				Filmdragerad.
Vancomycin	Kapsel				Antibiotika. OBS att inj-vätska som alternativ till kapslar ska ges oralt.
Venlafaxin	Depotkapsel				
Vimpat	Tablett				Filmdragerad
Waran	Tablett			*	
Xarelto	Tablett				
Zolpidem	Tablett				

Beskrivning

Dokumentnamn: Krossbarhet slutenvårdssortiment - Beskrivning - Hälsa- och sjukvård Region Gävleborg 13(14)

Dokument ID: 09-560112

Giltigt t.o.m.: 2027-03-13

Revisionsnr: 5

Ej längre i slutenvårdsdos, men fortsatt aktuell krossningsinformation 2025-08-26

Amiloferm (+ mite)	Tablett				
Ansativin	Kapsel				Antibiotika. Smakar illa. Innehållet löses i vatten för sond, eller i mat. Ges omgående. Extra skyddsåtgärder rekommenderas.
Anafranil	Tablett				Smakar illa.
Aprovel	Tablett				Filmdragerad.
Aurorix	Tablett				Filmdragerad. Generellt ok i sond, men ej studerat.
Cyklonova	Tablett				Filmdragerad.
Diklofenak	Enterotablett				Ökad risk för magtarmbiverkningar om den krossas.
Dipyridamol	Depotkapsel				Kapseln kan öppnas, men innehållet ej krossas. Kan möjligtvis ges i större sond/peg men risk för stopp finns. Överväg byte av läkemedel.
Nitrazepam	Tablett				Avregistrerad, finns som licensvara. Kan krossas samt bör enl. farm. bedömning gå att ge i sond.
Theralen	Tablett				Avregistrerad, finns som licensvara. Information saknas. Använd orala droppar.
Vorikonazole	Tablett				Använd i första hand i.v. Extra skyddsåtgärder rekommenderas om krossning.

Referenser

Dokumentnamn

Stöd vid läkemedelshantering, Region Skåne www.lakemedelshantering.se
White, R. & Bradnam, V. <i>Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes</i> , Tredje upplagan. London : Pharmaceutical press 2015.
Produktresuméer i Fass – Vårdpersonal
"Sväljes hel" (Apoteket AB 2013)
Zermörserbarhet und Verabreichungshinweise von Tabletten, Spital Pharmazie, Universitätsspital Basel. Länk
SHPA. <i>Australian Don't rush to crush handbook</i> , tredje upplagan. Society of Hospital pharmacists of Australia 2018.

Bilaga 1

- **Creon** – Se även www.lakemedelshantering.se. Kan med protokoll nedan ges i sond (> str10), dock helst med styrkan 5000IE som inte finns i Sverige. (Högre styrkor kan eventuellt fungera i PEG, farmaceutisk bedömning). Öppna kapseln och töm ner i en ren behållare. Addera 50-100ml lätt trögflytande/lätt förtjockad fruktjuice (ej vatten) så att de enteriska granulaten täcks och rör om försiktigt för att suspendera dem. Pausa sondmaten och spola sondslangen med vatten. Dra upp granulat-juice-suspensionen i en sonspruta och administrera i sonden med ett långsamt och försiktigt tryck. Källa: Ferrie S et al., *Pancreatic enzyme supplementation for patients receiving enteral feeds*. Nutr Clin Pract. 2011 Jun;26(3):349-51. Enligt samma källa kan patienter med hög dos protonpumpshämmare få krossade enteriska korn i sonden med bibehållen effekt
- **Natriumbikarbonat** – För patienter som star på högre doser peroralt natriumbikarbonat kan motsvarande dos ges intravenöst om ingen enteral väg finns. Står patienten dock bara på 1-2 gram per dag, bör njurkonsult kontaktas avseende om dosen bör ersättas eller ej. Enl kommunikation med Urska Bonnevier, överläkare njurmedicin.
- **Omeprazol** – Ska inte krossas. Kapseln kan öppnas och innehållet kan lösas upp i 10 ml 8,4 % natriumbikarbonat (25 ml sterilt vatten blandas med 2 krossade tabletter Natriumbikarbonat Recip 1 g) till en lösning på 2 mg/ml för administrering i sond. Interagerar med enteral nutrition. Om möjligt rekommenderas uppehåll med enteral nutrition 1 tim. före och 1 tim. efter administrering i sond. Kopierat från www.lakemedelshantering.se (efter förlaga i *Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes*). Överväg protonpumpshämmare i andra beredningsformer, t.ex. munsönderfallande tablett Lansoprazol.