

Memantin

Informationsblad om läkemedel som innehåller memantin.

Läkemedelsnamn

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. Exempel på läkemedel som innehåller memantin är **Ebixa**, **Marbodin**, **Nemdatine** och **Mentixa**.

Hur verkar läkemedel som innehåller memantin?

Läkemedlen verkar genom att blockera NMDA-receptorer och därigenom dämpa effekten av signalämnet glutamat i hjärnan. Vid Alzheimers sjukdom kan glutamat förekomma i förhöjda nivåer, vilket kan bidra till nedsatt nervcellsfunktion

Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar eller bromsar inte sjukdomen, men kan förbättra tankeförmåga, uppmärksamhet och förmågan att klara dagliga aktiviteter. Hos vissa personer kan även oro och agitation minska. Effekten varierar mellan individer, varför regelbunden uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen är till nytta.

Hur ska man ta läkemedel som innehåller memantin?

Läkemedel som innehåller memantin tas en gång dagligen, ungefär vid samma tidpunkt varje dag. Det spelar ingen roll om läkemedlet tas tillsammans med mat eller inte. Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först tar en klunk vätska.

Kan man dricka alkohol när man tar memantin?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och memantin är inte specifikt studerad.

Vilka biverkningar kan memantin ge?

En del personer får biverkningar av memantin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara trötthet, yrsel, huvudvärk och förstoppning. Som regel är dessa övergående.

Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

Vad gör man om man....

...glömt att ta en dos?

Om du glömmer bort att ta en dos, vänta till nästa dag och ta dosen vid ordinarie tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du glömmer flera doser, eller ofta glömmer att ta läkemedlet, kontakta din mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller läkemedelsutdelning.

...tagit dubbel dos?

Hoppa över nästa ordinarie dos och fortsätt därefter som vanligt. Om du känner obehag, kontakta läkare eller sjuksköterska.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan även vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Informationen är ett stöd och ersätter inte läkemedlets bipacksedel eller information från apotek. Vid frågor eller biverkningar, kontakta vården. Senast uppdaterad 02/2026.