Provtagningsanvisning Bihåla, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Bihåla, odling	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	**Dokumentansvarig:** Kvalitetssamordnare KML	**Beslutsinstans:** Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m.

Bihåla, odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Sår och övriga sekret. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) **Anamnes:** Beskriv aktuella besvär, ev. immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling och ev. allergi mot antibiotika. Vänligen ange med vilken provtagningsteknik provet är taget.
Provtagning	**Provtagningsmaterial:** Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: **Artikelnr: 201514** Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: **Artikelnr: 201520** **Utförande:** Före provtagningen ska provtagningsområdet mekaniskt rengöras om möjligt. Aspiration efter punktion (före spolning) av bihålan är referensmetod. I de fall detta inte är möjligt önskas riktad provtagning med pinne från pus i närheten av bihåleostiet. Aspriat kan skickas till laboratoriet i försluten spruta (vid lite material) eller sprutat på en e-swab.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej

Kommentarer/övrig upplysning	Vid nedsatt immunförsvar eller allvarligare infektioner kan även lågvirulenta bakterier orsaka infektion. Bedömning sker med hjälp av remissuppgifter. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling. Nasopharynxodling ger ej representativt fynd.
Medicinsk bakgrund/indikation	Vanligen utförs ingen odling vid akut sinuit. Indikation kan föreligga vid purulent sinuit så som vid terapisvikt, recidiv och långdragna, svårbehandlade fall.

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben (Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-29	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-789670. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.