

# HIV - Anonym provtagning - Familjehälsa

## Innehåll

1. Syfte och omfattning .....	1
2. Allmänt .....	1
3. Ansvar och roller .....	1
4. Beskrivning .....	2
5. Referenser .....	3

## 1. Syfte och omfattning

Att beskriva handläggning för anonym provtagning av HIV (human immunodeficiency virus). Rutinen gäller Familjehälsa, Ungdomsmottagning (UM) och Mödravårdscentralen (MVC).

## 2. Allmänt

Hälso- och sjukvården har enligt smittskyddslagen skyldighet att skyndsamt utföra ett HIV-test på en person som begär detta, om det finns en rimlig klinisk eller epidemiologisk misstanke om att personen utsatts för en smittrisk. Patientens egen önskan om ett test räcker. Provtagning för HIV skall tillämpas generöst och vara lättillgänglig för alla. HIV-test är kostnadsfritt för patienten om det görs inom landstingets hälso- och sjukvård.

Provtagning för HIV kan ske anonymt på patientens begäran. Observera att anonym provtagning endast kan tillämpas vid HIV-provtagning. Krav på journalföring gäller inte vid anonym provtagning av HIV. Om provet visar sig vara positivt börjar kravet på journalföring att gälla.

## 3. Ansvar och roller

Barnmorska på MVC eller UM tar venprov för anonymt HIV-test på patientens begäran enligt denna rutin.

## 4. Beskrivning

Patienten får ett unikt anonymnummer som hen ska behålla till dess provsvar har medelats vid ett återbesök.

Anonymnummer skapas elektroniskt via applikationen Reservnummer. Man hittar den via START – Alla program – Verksamhetsprogram – Reservnummer.

Välj Sök/Skapa/Markera. Använd länken under punkt 2: Oidentifierad. Välj kön och tryck på Spara. Anonymnummer skapas automatiskt på dagens datum.

Vid telefon- eller direktkontakt ges patienten en tid till barnmorska för provtagning. I tidboken skrivs det anonyma numret, kön samt det överenskomna namn man skall ropa upp.

När patienten kommer för provtagning gör barnmorskan en anteckning som endast innehåller anledning till provtagning, det givna anonymnumret och kön. Anteckningen förvaras separat i ett låst läkemedelsskåp fram till återbesöket för provsvar. Venprov tas och anonymnumret används på remiss till laboratoriet. Ett återbesök bokas in en vecka senare. Undvik att lägga återbesök på fredagar. Provsvar vid anonym provtagning kan inte meddelas över telefon eller brev.

Vid positivt provsvar noteras anteckningarna i journal med full identitet. Vid negativt provsvar kan handlingen kastas direkt efter återbesöket.

### Vid positivt provsvar

Kontakta omedelbart infektionsjouren på Gävle sjukhus via telefon för diskussion om fortsatt omhändertagande. En verifierande provtagning bör ske samma dag eller senast dagen efter återbesöket, företrädesvis på infektionsmottagningen. Smittspårning sker via Infektionsmottagningen.

Kontakta Mödrahälsovårdsöverläkaren via telefon, som anmäler fallet till Smittskydd inom 24 timmar från laboratoriesvar.

Vid återbesök meddelas provsvaret av Mhöl tillsammans med barnmorskan. Informera patienten om att en verifierande provtagning måste sker innan man med säkerhet kan ställa diagnosen. Ge patienten förhållningsregler [Smittskyddsbladet](#) HIV. Informera om den fortsatta planeringen på Infektionskliniken.

Om patienten vägrar uppge sin identitet kontaktas smittskyddsläkaren. Om patienten uteblir från det planerade återbesöket kontaktas smittskyddsläkaren.

## 5. Referenser

Dokumentnamn	Plats
Smittskyddslagen 2004:168 Förordning (2008:363) om provtagning för hiv-infektion	Socialstyrelsen
Tillgänglighet för HIV-test	Socialstyrelsen
Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom.	Socialstyrelsen
Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner – ansvar, tillgänglighet och sekretess.	Socialstyrelsen
<a href="#">HIV anonymprovtagning - regionsgemensam rutin</a>	

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet