

# Råd angående handläggning av patienter med LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS, LSA hos män - Hudkliniken

(tidigare balanitis xerotica obliterans, BXO)

Detta är en inte helt ovanlig åkomma som vanligtvis uppträder i åldersgrupperna 15-50 år.

## Klinik:

En ofta bandformad, vit, ibland verrukös förhud som stramar och som kan ge phimosis, recidiverande balaniter, sår och fissurbildningar vilket ofta kan försvåra erektion och samliv. Bleka områden samt ytliga kärl kan ses på glans. Meatus ibland engagerat med förträngning. Frenulum förtjockad.

## Behandling

Grupp 4-steroid såsom salva/kräm Dermovat enligt behandlingsschema:

**V 1-4:** Dermovat till kvällen

**V 5-8:** Dermovat varannan kväll

**V 9-12:** Dermovat 2ggr/vecka

Smörj därefter 1 gång/v

Återbesök efter 1-2 månader för utvärdering av behandlingseffekten. Behandling kan behövas under många månader.

Atrofiriskan är försumbar!!!

En 25 g tub brukar räcka under en 3-månadersperiod.

## REMISSPOLICY

### Hudkliniken:

Diagnostiska problem.

### Kirurgkliniken

LSA som inte svarat tillräckligt bra på gängse lokalbehandling med Dermovat.

Mångårig LSA som förändrats och inger cancermisstanke. Det finns en överrepresentation i skivepitelcancer i denna åkommegrupp precis som hos kvinnor.

## Referenser

Dokumentnamn	Plats
Patientinformation	<a href="http://www.huden.nu/dermatologen">www.huden.nu/dermatologen</a>

## Dokumentinformation

Dokumentet är granskat av:

Elisabeth Höchtl, överläkare

Anette Edlund, chefssekreterare

Tommy Lundmark, chefsläkare, division primärvård

Börje Svensson, chefsläkare, division primärvård

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet