# LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS, LSA hos män, råd angående handläggning - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

**(tidigare balanitis xerotica obliterans, BXO)**

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet

Detta är en inte helt ovanlig åkomma som vanligtvis uppträder i åldersgrupperna 15-50 år.

## Klinik:

En ofta bandformad, vit, ibland verrukös förhud som stramar och som kan ge fimosis, recidiverande balaniter, sår och fissurbildningar vilket ofta kan försvåra erektion och samliv. Bleka områden samt ytliga kärl kan ses på glans. Meatus ibland engagerat med förträngning. Frenulum förtjockat.

## Behandling

Grupp **IV**-steroid såsom salva/kräm Dermovat enligt behandlingsschema:

**Vecka 1-4:** Dermovat till kvällen
**Vecka 5-8:** Dermovat varannan kväll
**Vecka 9-12:** Dermovat 2 gånger/vecka
Smörj därefter 1 gång/vecka.

Återbesök efter 1-2 månader för utvärdering av behandlingseffekten. Behandling kan behövas under många månader.

Atrofirisken är försumbar.
En 25 g tub brukar räcka under en tremånadersperiod.

## REMISSPOLICY

### Hudkliniken:

Diagnostiska problem.

### Kirurgkliniken

LSA som inte svarat tillräckligt bra på gängse lokalbehandling med Dermovat.
Mångårig LSA som förändrats och inger cancermisstanke. Det finns en överrepresentation i skivepitelcancer i denna åkommegrupp precis som hos kvinnor.

## Referenser

Internetmedicin.se

## Dokumentinformation

Dokumentet är granskat av:
Elisabeth Höchtl, överläkare
Liselotte Kax, chefssekreterare

Tidigare utgåvor:
Tommy Lundmark, chefläkare
Per Melander, chefläkare

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet