

Komplettering av vaccination hos tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar - Rutin - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Komplettering av vaccination hos tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar	Dokumentkategori: Rutin	Omfattning: Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Smittskyddsläkaren	Dokumentansvarig: Administratör, smittskydd	Beslutsinstans: Smittskydd
Diarienummer: -		Datum för översyn: Se giltigt t o m

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Innehåll	2
2.1.	Allmänt	2
2.2.	Före vaccination	3
2.3.	Barn 1-5 år	3
2.3.1.	Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*, hemophilus influenza och hepatit B**	3
2.3.2.	Grundvaccination mot pneumokocksjukdom	3
2.3.3.	Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund	4
2.3.4.	Vaccination mot tuberkulos	4
2.4.	Barn 6-12 år	4
2.4.1.	Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio* och hepatit B**	4
2.4.2.	Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund	4
2.4.3.	Vaccination mot tuberkulos	4
2.5.	Barn > 12 år	5
2.5.1.	Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*	5
2.5.2.	Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund	5
2.5.3.	Vaccination mot tuberkulos	5
2.6.	Vaccination mot HPV, Humant papillomvirus	5
3.	Kommunikation och implementering	6
4.	Medverkande och granskare	6
5.	Referenser	6
6.	Översiktstabell	7

1. Syfte och omfattning

Syftet med detta dokument är att beskriva rutiner och rekommendationer för vaccinering av tidigare ofullständigt, eller helt ovaccinerade, barn och ungdomar.

2. Innehåll

2.1. Allmänt

Barn som är helt ovaccinerade, partiellt vaccinerade eller där man inte alls känner till vaccinationsstatus ger såväl barnhälsovården som skolhälsovården återkommande utmaningar. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram anvisningar för barn och ungdomar som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade.

Smittskydd i Gävleborg har anpassat förslaget i enlighet med de vaccin som är upphandlade i vår region (Vaxneuvance istället för Prevenar13®, samt Engerix-B®).

Nedanstående rekommendationer gäller barn som är eller kan antas vara ovaccinerade. För de som är delvis vaccinerade får man komplettera enligt detta schema. Smittskydd Gävleborg rekommenderar vaccination enligt detta dokument.

2.2. Före vaccination

Tidigare vaccinationer bör verifieras med skriftliga vaccinationsdokument från hemlandet. Saknas sådana får man göra en rimlighetsbedömning utifrån de uppgifter föräldrarna lämnat. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att asylsökande från Syrien, Afghanistan, Irak och Ukraina erbjuds vaccination redan vid första vårdkontakten.

Se Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

- [Vaccination av barn och ungdomar](#)
- [Rekommendationer om vaccination av människor på flykt från Ukraina](#)
- [Riskländer avseende hepatit B](#)

2.3. Barn 1-5 år

Barnhälsovården i Gävleborg följer - [Rikshandboken för barnhälsovård](#)

2.3.1. Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*, hemophilus influenza och hepatit B**

Erbjud en dos Sex valent vaccin Hexyon (från Oriola).

Efter två månader ges en andra dos Hexyon

En tredje dos Hexyon ges tidigast sex månader efter den andra dosen.

Schemat innebär för barn > 1 års ålder en viss övervaccination av Hib (de behöver egentligen bara en dos), men utan risk för allvarliga biverkningar och ett minskat antal injektioner.

Den fjärde dosen (DTaP-IPV), Tetravac®, som annars ges vid 5 års ålder ges 3–5 år efter den tredje dosen.

För de barn som inte behöver grundvaccination av DTaP-IPV eller endast enstaka doser - komplettera med monovalent hepatit B-vaccination, Engerix-B®, med ett intervall på 0, 1 och tidigast 6 månader mellanrum om barnet saknar skydd mot hepatit B.

2.3.2. Grundvaccination mot pneumokocksjukdom

För barn födda 1 juli 2007 eller senare erbjuds vaccination mot pneumokocker, Vaxneuvance. Barn i åldern 1–2 år erbjuds 2 doser med 2 månaders intervall. För barn i åldern ≥ 2 –5 år erbjuds en dos.

2.3.3. Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund

Erbjud M-M-RVAXPRO*** (från MSC) dos 1 från 18 månaders ålder. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med materiella antikroppar.

2.3.4. Vaccination mot tuberkulos

Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade, om PPD är 0 mm eller IGRA-neg (på barn ≥ 2 år). För barn upp till 6 rekommenderas vaccination vid familjeursprung från ett land med ökad eller hög TB-förekomst eller vid något av följande kriterier som innebär ökad risk att utsättas för smitta:

- aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
- inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

2.4. Barn 6-12 år

2.4.1. Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio* och hepatit B**

Om man önskar minska antalet injektioner när barnet behöver grundvaccineras mot DTaP-IPV* kan Hexyon enligt sedvanligt schema övervägas, det vill säga två doser med två månaders mellanrum och en tredje dos tidigast sex månader efter den andra dosen. Detta är så kallad "off label vaccination" eftersom data saknas för barn över 36 månader. Barnet får dessutom vaccination mot Hib, vilket inte behövs. Vid "off label vaccination" behövs läkarordination.

Den fjärde dosen DTaP-IPV, Tetravac®, som annars ges vid 5 års ålder ges 3–5 år efter den tredje dosen.

Om Tetravac (DTaP-IPV) används eller om barnet inte behöver grundvaccination mot DTaP-IPV eller endast enstaka doser - komplettera med monovalent hepatit B-vaccination, Engerix-B®, med ett intervall på 0, 1 och tidigast 6 månader mellanrum om barnet saknar skydd mot hepatit B. Gäller barn födda 2005 och senare.

2.4.2. Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund

Erbjud två doser M-M-RVAXPRO*** med minst en månads mellanrum, men helst längre. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med maternella antikroppar.

2.4.3. Vaccination mot tuberkulos

Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter IGRA(quantiferon) /PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade om PPD är 0 mm eller IGRA-neg. Barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas vaccination ifall de uppfyller något av följande kriterier som innebär ökad risk att utsättas för smitta:

- aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
- inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

2.5. Barn > 12 år

2.5.1. Grundvaccination mot difteri, tetanus, kikhosta, polio*

Erbjud D + T + polio. Tetravac® (DTaP-IPV*) kan övervägas i skolvaccinationsprogrammet även om barnet är >12 år om man önskar minska antalet injektioner. Vaccinera enligt sedvanligt schema, det vill säga två doser med två månaders mellanrum och en tredje dos tidigast sex månader efter den andra dosen. Att ge Tetravac® till barn >12 år så kallad "off label vaccination" eftersom vaccinet inte är godkänt för barn över 12 år på grund av att data saknas. Vid "off label vaccination" behövs läkarordination.

Erbjud eller informera om en fjärde dos dTap + polio, Triaxis (dTap) + Imovax Polio® 3–5 år efter den tredje dosen.

2.5.2. Grundvaccination mot mässling-påssjuka-röda hund

Erbjud två doser M-M-RVAXPRO*** med minst en månads mellanrum, men helst längre. Tidigare doser givna före 12 månaders ålder räknas inte på grund av interaktion med maternella antikroppar. Informera att flickorna inte får vara gravida eller bli det inom 4 veckor efter vaccination.

2.5.3. Vaccination mot tuberkulos

Barn med ökad risk för tuberkulos erbjuds BCG-vaccination efter IGRA(quantiferon) / PPD-test om de inte tidigare är vaccinerade, om PPD test visar 0 mm eller IGRA-neg. Barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas vaccination ifall de uppfyller något av följande kriterier löper ökad risk att utsättas för smitta:

- aktuell TB hos en nära anhörig eller hushållskontakt
- inför planerad längre (mer än tre månader) vistelse i ett land eller område med hög TB-förekomst, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen.

2.6. Vaccination mot HPV, Humant papillomvirus

Erbjud flickor födda 1999 eller senare vaccination med Gardasil 9, två doser med 6 månaders mellanrum för barn 9-13 år. Tredosschema, 0,2 och 6 månaders mellanrum ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.

**Angående poliovaccination: I länder med låg hygienisk standard och vid svåra sociala förhållanden i hemlandet är vaccinet otillförlitligt och barnen bör därför betraktas som ovaccinerade. Tre peroralt givna doser under någorlunda goda förhållanden bör endast kompletteras med en injektion av poliovaccin medan 1–2 perorala doser innebär att man måste börja om från början.*

***Angående hepatit B-vaccination: Sedan 2005 har barn där föräldrar, mor- eller farföräldrar härstammar från land där prevalensen av hepatit B är minst två procent erbjudits hepatit B-vaccination i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Sedan juli 2016 erbjuds alla barn i Region Gävleborg hepatit B-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.*

****Angående MPR-vaccination och andra underliggande sjukdomar: Vid hälsoundersökning av nyanlända barn kontrolleras bland annat PPD och/eller IGRA samt hiv- och hepatit B-serologi. Om provtagning och/eller provsvar fördröjs går det bra att ändå MPR-vaccinera barnet, förutsatt att det inte finns några kliniska tecken på underliggande sjukdom. Latent tuberkulos och icke-symptomgivande hiv-infektion är ingen kontraindikation för MPR-vaccination. I optimala fall bör man dock invänta resultatet på prover men om risken är utebliven MPR-vaccinering så bör vaccinering ske innan provsvar. Eftersom MPR-vaccinationen kan försvaga tuberkulinreaktionen bör man vänta 4 veckor efter MPR-vaccinationen med att sätta/testa med PPD/IGRA. Om PPD eller IGRA test sätts/tas först så kan MPR ges därefter utan särskilt intervall.*

3. Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samverkanswebben

4. Medverkande och granskare

Medverkande och granskare till dokumentet är överläkare infektion, överläkare asyl och migranthälsa samt apotekare läkemedelsenheten.

5. Referenser

Dokumentnamn	Plats
Vaccination av barn och ungdomar – Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer	folkhalsomyndigheten.se
Rekommendationer om vaccination av människor på flykt från Ukraina	folkhalsomyndigheten.se
Riskländer avseende hepatit B	folkhalsomyndigheten.se
Vacciner som används i Sverige	folkhalsomyndigheten.se
Riskhandboken barnhälsovård, vaccination	riskhandboken-bhv.se

Översiktstabell se nästa sida.

6. Översiktstabell

Typ av vaccin/ålder	Barn 1-5 år	Barn 6-12 år	Barn > 12 år
Hexyon hepatit B	1 dos fortsatt därefter med Tetravac®		
Tetravac® (DTPa-IPV)	Dos två 2 mån efter Hexyon® Dos tre 6 mån efter dos två Dos fyra ges 3-5 år efter den tredje dosen	Två doser med 2 mån intervall Dos tre 6 mån efter dos två Dos fyra ges 3-5 år efter den tredje dosen	
Vaxneuvance	Erbjuds två doser med minst 2 mån intervall. (Behovet av boosterdos för barn 12-23 månader är inte fastställt)		
D+ T+ Poilo eller Tetravac®			Kan användas i skolvaccinationsprogrammet även om barnet är >12 år, off label. Två doser med 2 mån intervall. Dos tre 6 mån efter dos två. Erbjud eller informera om en fjärde dos 3-5 år efter den tredje dosen.
M-M-RVAXPRO MPR	Erbjud första dosen MPR	Erbjud två doser med MPR med minst 1 månads intervall, men helst 1-5 år mellan doserna	Erbjud två doser med MPR med minst 1 månads intervall, men helst 1-5 år mellan doserna. Info till flickorna att de inte får bli gravida upp till 4 veckor efter vaccination.
Engerix-B® 10ug	Kan ges vid behov till barn från endemiska områden för hepatit B. Två doser med 1 mån intervall. Dos tre tidigast 6 mån efter dos två.	Kan ges vid behov till barn från endemiska områden för hepatit B Två doser med 1 mån intervall. Dos tre tidigast 6 mån efter dos två.	Erbjuds barn i 12-15 års åldern om de är från endemiska områden för hepatit B. Två doser med 1 mån intervall. Dos tre tidigast 6 mån efter dos två.
Engerix-B® 20ug	Används ej till barn < 16 år	Används ej till barn < 16 år	≥ 16 år. Två doser med 1 mån intervall. Dos tre tidigast 6 mån efter dos två.