Upprättare: Victoria G Sjöcrantz

Fastställare: Michiel Dooper

Provtagningsanvisning Cytologi Ascites - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	• Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län **eller** • Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	Använd: • Flaska med skruvlock 100 mL • Flaska med skruvlock 250 mL Provet: Lämplig mängd 100 mL, dock ej mer än 200mL. Vid blodigt exsudat tillsätts 1 mL heparin/200mL exsudat. Använd Heparin 5000IE/mL. Låt patienten rotera några varv i sängen eller gå några steg före tappning för att undvika sedimentation av cellerna.
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp. Lämnas under laboratoriets öppettider (måndag-fredag kl. 8.00–16.00) till enheten för Klinisk Patologi och Cytologi. Övriga tider lämnas provet till Laboratoriemedicins provinlämning på plan 3.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kompletterande analys i form av immunhistokemisk analys på cellblock sker utifrån cytodiagnostikers/patologläkares bedömning. Eftergranskning av preparat sker på begäran.
Patientinformation	Ej tillämpligt

Kopia gäller endast utskriftsdatumet

Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	Inga övriga kommentarer
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga ökad mängd ascites.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet