

Donepezil

Informationsblad om läkemedel som innehåller donepezil

LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. Donepezil heter till exempel även Aricept. Läkemedlet finns både i tablettform samt som munsönderfallande tablett.



HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DONEPEZIL?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inläring och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DONEPEZIL?

Läkemedel med donepezil tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt.

Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.

Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska. Munsönderfallande tabletter placerar du på tungan och låter dem smälta innan du sväljer, med eller utan vatten.

VAD GÖR MAN OM MAN;

• GLÖMT ATT TA EN DOS?

Om du glömmer bort att ta din dos, vänta till nästa dag och ta tablett vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer bort att ta din medicin i över en vecka, kontakta din behandlande mottagning innan du tar någon mer dos. Om du ofta glömmer bort att ta din medicin, kontakta din behandlande mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

• TAGIT DUBBEL DOS?

Hoppa över de två nästkommande ordinarie doserna, fortsatt sedan som vanligt. Känner du något obehag, kontakta din läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR DONEPEZIL?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och donepezil är inte specifikt studerad.

VILKA BIVERKNINGAR KAN DONEPEZIL GE?

En del personer får biverkningar av donepezil. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring eller huvudvärk. Som regel är dessa biverkningar övergående. Somliga kan få sömnproblem. Då kan det ibland hjälpa att ta läkemedlet på morgonen istället för på kvällen. Ändra dock aldrig din medicinering utan att först kontakta din läkare/sjuksköterska.

Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR?

Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Senaste revidering 09/2023.