

Rivastigmin plåster

Informationsblad om läkemedel i plåsterform som innehåller rivastigmin.

LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. **Exelon, Rivastor, Prometax och Rigmin** är läkemedel i plåsterform som innehåller det verksamma ämnet rivastigmin.



HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

VILKA BIVERKNINGAR KAN DET GE?

En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående, kräkningar och dålig aptit. Som regel är dessa biverkningar övergående. Somliga personer får hudirritationer av plåstret. Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

HUR SKA PLÅSTREN KASTAS?

Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Om din hemkommun bränner hushållsavfall kan du kasta plåstret tillsammans med hushållsavfallet. I annat fall, lämna tillbaka använda plåster till apoteket, helst i originalförpackningen.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN ANVÄNDER PLÅSTRET?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och rivastigmin är inte specifikt studerad.

HUR SKA MAN ANVÄNDA PLÅSTER SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?

Förvara plåstren i rumstemperatur. Behåll plåstret i plåsterkuverten tills de ska användas.

Plåstret ska bytas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Ta bort föregående dags plåster innan du sätter på ett nytt. Använd bara ett plåster i taget. Klipp inte i plåstret. Du kan skriva datum eller veckodag och klockslag på plåstret med kulspetspenna för att lättare se när det ska bytas.

Plåstret ska fästas på ren, torr (och fri från hudlotion), hårfri, oskadad hud på övre eller nedre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen (undvik själva bröstet). Plåstret ska fästas på ett nytt ställe varje gång.

Du kan behålla plåstret på vid dusch och bad. Var försiktig med att utsätta plåstret för yttre värme under längre tid (till exempel solande eller bastubad).

VAD GÖR MAN OM MAN

- GLÖMT ATT BYTA PLÅSTER?

Om du upptäcker att du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt omedelbart. Glöm inte att ta bort det gamla. Du kan sedan byta plåster i vanlig tid nästa dag. Om du glömmer bort att använda plåstret under mer än 3 dagar, kontakta din behandlande mottagning innan du sätter på ett nytt plåster.

Om du ofta glömmer att använda dina plåster, kontakta din behandlande mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med medicinutdelning.

- ANVÄNT FÖR HÖG DOS?

Om du oavsiktligt satt på fler än ett plåster, ta av alla plåstren från huden och ta kontakt med din läkare/sjuksköterska.

- ETT PLÅSTER FALLER AV?

Om det faller av, sätt på ett nytt för resten av dygnet, byt sedan plåster i vanlig tid nästa dag.

Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Senaste revidering 09/2023.