

# Rivastigmin plåster

Informationsblad om läkemedel i plåsterform som innehåller rivastigmin.

## Läkemedelsnamn

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. **Exelon, Rivastor och Rigmin** är läkemedel i plåsterform som innehåller det verksamma ämnet rivastigmin.

## Hur verkar läkemedel som innehåller rivastigmin?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

## Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar eller bromsar inte sjukdomen, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättrad förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättrad språklig förmåga. Även förmågan att klara dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten varierar mellan individer, varför regelbunden uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen är till nytta.

## Vilka biverkningar kan det ge?

En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar och nedsatt aptit. Som regel är dessa övergående. Somliga personer får hudirritationer av plåstret. Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

## Hur ska plåstren kastas?

Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande sidan inåt. Om din hemkommun bränner hushållsavfall kan du kasta plåstret tillsammans med hushållsavfallet. I annat fall, lämna tillbaka använda plåster till apoteket, helst i originalförpackningen.

## Kan man dricka alkohol när man använder plåstret?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och rivastigmin är inte specifikt studerad.

## **Hur ska man använda plåster som innehåller rivastigmin?**

Förvara plåstren i rumstemperatur. Behåll plåstret i kuvertet tills det ska användas.

Plåstret ska bytas en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag. Ta bort föregående dags plåster innan du sätter på ett nytt. Använd endast ett plåster i taget. Klipp inte i plåstret. Du kan skriva datum eller veckodag och klockslag på plåstret med kulspetspenna för att lättare se när det ska bytas.

Plåstret ska fästas på ren, torr (och fri från hudlotion), hårfri, oskadad hud på övre eller nedre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen (undvik själva bröstet). Fäst plåstret på ett nytt ställe varje gång.

Du kan behålla plåstret vid dusch och bad. Var försiktig med att utsätta plåstret för yttre värme under längre tid (till exempel solande eller bastubad).

## **Vad gör man om man....**

### **...glömt att byta plåster?**

Om du upptäcker att du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt omedelbart och ta bort det gamla. Byt därefter plåstret i vanlig tid nästa dag. Om du inte använt plåstret på mer än tre dagar, kontakta din behandlande mottagning innan du sätter på ett nytt plåster.

Om du ofta glömmer att använda dina plåster, kontakta din mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med läkemedelshantering.

### **...använt för hög dos?**

Om du oavsiktligt satt på fler än ett plåster, ta bort alla plåster och kontakta läkare eller sjuksköterska.

### **...ett plåster faller av?**

Om det faller av, sätt på ett nytt för resten av dygnet och byt sedan plåster i vanlig tid nästa dag.

*Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Informationen är ett stöd och ersätter inte läkemedlets bipacksedel eller information från apotek. Vid frågor eller biverkningar, kontakta vården. Senast uppdaterad 02/2026.*