Provtagningsanvisning Hörselgång, odling - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Provtagningsanvisning Hörselgång, odling	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Vårdenhetschef KML	**Dokumentansvarig:** Kvalitetssamordnare KML	**Beslutsinstans:** Vårdenhetschef KML
Diarienummer: Ej tillämpligt.		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m.

Hörselgång, odling

Remiss	Beställning via Cosmic eller LabPortalen. Sökväg: Mikrobiologi → Sår och övriga sekret. Alt. hittas via sökfunktionen. Reservrutin: Pappersremiss (Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg) **Anamnes:** Beskriv aktuella och relevanta besvär, ev immunsuppression, grundsjukdom, antibiotikabehandling, avvikande provtagningsmoment och ev allergi mot antibiotika.
Provtagning	**Provtagningsmaterial:** Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: **Artikelnr: 201514** Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: **Artikelnr: 201520** **Utförande:** <u>Allmän rekommendation:</u> Före provtagningen bör provtagningsområdet mekaniskt rengöras om möjligt för att minska provtagningsförorening med koloniserande flora. <u>Mediaotit:</u> - Aspiration genom intakt trumhinna är att föredra för optimal mikrobiologisk diagnostik. Material som aspirerats från mellanörat kan sprutas på en provtagningspinne. Skriv då att det är aspirat under medicinsk information. - Man kan även samla sekret från mellanörat efter paracentes, spontanperforation eller från patient med transmyringealt mellanöredränage (sk. plaströr) med en provtagningspinne. Då bör dock beröring av hörselgångsväggen undvikas. <u>Extern otit:</u> Sekretprov tas med pinne från angripet område.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.

Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	I fall av akut otit letar man främst efter luftvägspatogena bakterier. Vid kronisk otit och extern otit letar man efter alla bakterier som inte utgör normal hörselgångsflora/hudflora. Vid nedsatt immunförsvar eller allvarligare infektioner kan även lågvirulenta bakterier orsaka infektion. Bedömning sker med hjälp av remissuppgifter. Potentiellt patogena bakterier art- och resistensbestäms. Resistensbestämning är ingen uppmaning till behandling.
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstanke om bakteriellt orsakad otit

Kommunikation och implementering

Dokumentet finns publicerat på samlad sida för provtagningsanvisningar på Samverkanswebben (Provtagningsanvisningar - Region Gävleborg).

Medverkande och granskare

Provtagningsanvisning framtagen och granskad av metodansvarig samt granskad av medicinskt ansvarig.

Senaste revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2025-08-29	1	Nytt dokument utifrån uppdaterad dokumentstyrning, ersätter dok. 09-789449. Ändrar till journalsystem Cosmic och lägger till sökväg i Cosmic.