

Råd angående handläggning av patienter med huvudlöss - Hälsoval Region Gävleborg

MEDEL: Dimetikoner **(exempelvis Hedrin, Paranix m.fl.)**

- Det viktigaste i behandlingen är information och undersökning av alla som möjligtvis kan vara smittade, d.v.s. familj, vänner, dagbarn eller mor- och farföräldrar.
- Endast de som har konstaterade löss ska behandlas.
- Behandla med dimetikonlösning i torrt hår. Bena upp håret och var noga med att medlet kommer ner i hårbotten samt bakom öronen och i nacken (det är där ägg och levande löss finns) men hela håret ska blötas upp med lösningen. Följ noga den bruksanvisning som finns i förpackningen. Det är viktigt att behandlingstiden inte avkortas.
- Behandlingen upprepas efter 1 vecka.
- Mellan behandlingarna och under 10-14 dagar efter sista behandlingen bör alla familjemedlemmar finkammas dagligen innan sänggående.
- Nykläckta nymfer går inte över till annan människas hår och är därmed inte smittsamma. De är fullvuxna efter cirka 10 dagar.
- OBS! Tomma vita äggskal tyder inte på kvarvarande smitta.
- Huvudlöss sprids enbart via kropps-/hårkontakt och inte via döda ting som mössor, kuddar eller dylikt.
Kammar och borstar rengörs noggrant och bör inte delas.

Dokumentinformation

Dokumentet har granskats av:

Elisabeth Höchtl, öl/medicinsk rådgivare, granskare