

## Läkemedelshantering - Hållbarhet i bruten förpackning

Uppgifterna i tabellen är hämtade från [Svensk Läkemedelsstandard SLS 2021.1.](#)

Angiven användningstid gäller under förutsättning att tillverkaren inte angivit kortare hållbarhetstid på förpackning, i FASS eller bipacksedel. Kom ihåg att alltid anteckna brytningsdatum på förpackningen. För läkemedel med kortare hållbarhet än 24 timmar antecknas även klockslag.

Det är viktigt att uttag görs ur förpackningen på ett sätt som förhindrar kontamination av innehållet (mer information, se [Läkemedelshantering - Läns-gemensam rutin för hälso- och sjukvård Region Gävleborg](#))

Injektionsläkemedel	Okonserverade	12 timmar i rumstemperatur 24 timmar i kylskåp (2-8°C)
	Konserverade, i flerdosbehållare	7 dagar till flera patienter 28 dagar till enskild patient
Behållare såsom kassetter, pumpar och sprutor vid beredning på avdelning		12 timmar
Glidslem för kateterisering och liknande beredningar	Okonserverade	1 vecka, kylskåpsförvaring
Spolvätskor	Vid kirurgi	Engångsbruk, omedelbar användning
	Annan användning (renrutin)	24 timmar
Ögondroppar och ögonsalvor (OBS Andra krav vid kirurgi eller i skadat öga, då gäller omedelbar användning)	Okonserverade	Engångsbruk, omedelbar användning
	Konserverade	7 dagar till flera patienter 28 dagar till enskild patient
Flytande läkemedel för in- eller utvärtes bruk	Konserverade	6 månader
	Konserverade till prematura barn	1 månad
	Konserverade vid inhalation	1 månad
	Konserverade till sårvård	1 månad
	Okonserverade	1 vecka, kylskåpsförvaring
Desinfektionsmedel (OBS Andra krav vid kirurgi, då gäller 24 timmar)	Alkoholbaserade (ex. Klorhexidinsprit, M-sprit)	1 månad till flera patienter
	Vattenbaserade (ex. Klorhexidinlös, Alsollös, Alsolsprit)	1 vecka till flera patienter
Krämer, salvor, geler för utvärtes bruk	Sterila salvor till stora öppna sår eller allvarligt skadad hud	Som för ögonsalvor
	Konserverade	6 månader
	Okonserverade	1 vecka, kylskåpsförvaring
Näsdroppar och nässprayer som är vattenbaserade		Endast till en patient En behandlingsperiod Okonserverade beredningar används dock längst 10 dagar.

Injektioner/Infusioner som beretts på avdelning/mottagning (utförd tillsats, spädning, uppdragning i spruta etc.) ska användas inom 12 timmar.

Ovan angivna tider gäller under förutsättning att uttag sker aseptiskt och att innehållet inte har förändrats synbart. Observera att kortare hållbarhetstid kan gälla för enskilda läkemedel till exempel till följd av särskild användning eller av kemiska skäl, se FASS.