

Skyddsåtgärdspyramiden - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg samt Folk tandvården AB

3. Risk för att flera vård-/omsorgstagare/anställda utsatts för smitta och riskerar att insjukna

Tillägg
munskydd och visir vid
alla nära kontakter (<2 m
och sammanlagt mer än min
15 min) **

2. Risk för att flera vård-/omsorgstagare/anställda utsatts för smitta och riskerar att insjukna

Tillägg munskydd i första hand i alla
situationer där avstånd inte kan
hållas**

1. "Normalläge"

Munskydd i första hand vid alla nära kontakter (<2 m och
sammanlagt mer än min 15 min) med vårdtagare*

Avstånd

Basala hygienrutiner

OBS! Vid beslut om en åtgärd gäller även det som står nedanför den åtgärden i pyramiden.

*Individuell bedömning kan göras i vissa verksamheter (t.ex. i funktionshinderomsorg, barnhälsovård)

**Åtgärden tidsbegränsas i samråd med vårdhygien

För att skydda mot smittspridning av covid-19 vidtas flera åtgärder inom vård och omsorg. Under särskilda omständigheter kan nivån av dessa skyddsåtgärder successivt behöva höjas ([source control](#)) (platina id: 09-673012). Detta illustreras i pyramiden ovan och förklaras i texten nedan.

1. "Normalläge" vid ökad samhällspridning

Ingen känd exponering har skett. Eventuella smittsamma vårdtagare har vårdats med skyddsutrustning. Ingen personal med bekräftad covid-19 har insjuknat under ett arbetspass eller inom 48 h efter ett arbetspass. Personal tillämpar basala hygienrutiner och håller avstånd till vårdtagare och kollegor i så hög utsträckning som möjligt. Vid nära kontakt med vårdtagare utan misstänkt/bekräftad covid-19 används munskydd IIR i första hand för att minska risken för smitta från personal som ännu inte utvecklat symtom.

2. Risk för att flera anställda/vård-/omsorgstagare utsatts för smitta och riskerar att insjukna

Utöver åtgärder i normalläge rekommenderas att personal dessutom använder munskydd IIR i första hand i situationer då avstånd inte kan hållas till kollegor och andra som vistas på enheten. Syftet är att minska risken för att anställda/vård-/omsorgstagare smittas av en anställd/vård-/omsorgstagare som ännu inte utvecklat symtom. Viktigt att fortsätta att hålla avstånd och vara noggrann med handhygien! Kontakt med vårdhygien rekommenderas. I samråd med vårdhygien beslutas om hur länge åtgärden ska gälla.

3. Risk för att flera anställda/vård-/omsorgstagare utsatts för smitta och riskerar att insjukna

Smittsam anställd/vård-/omsorgstagare har träffat flera anställda/vård-/omsorgstagare. Förutom att fortsätta följa åtgärder enligt 1-2, rekommenderas att man vid alla nära kontakter (<2 m och sammanlagt mer än 15 min under 24 timmar) bär både visir och munskydd IIR. Syftet är att skydda anställda/vård-/omsorgstagare från att bli smittade av anställd/vård-/omsorgstagare som utsatts för smitta men ännu inte fått symtom. Kontakt med vårdhygien rekommenderas. I samråd med vårdhygien beslutas om hur länge åtgärden ska gälla.