Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - Anafylaxi vid vaccination i hemmet - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Titel: Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - Anafylaxi vid vaccination i hemmet - Instruktion - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg	**Dokumentkategori:** Instruktion	**Omfattning:** Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Dokumentägare: Enhetschef läkemedelsenheten	**Dokumentansvarig:** Farmaceut läkemedelsenheten	**Beslutsinstans:** Enhetschef läkemedelsenheten
Diarienummer: Ej tillämpligt		**Datum för översyn:** Se giltigt t.o.m

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv – Anafylaxi vid vaccination i hemmet

Nedanstående ordinationer enligt generella direktiv avser läkemedel som kan behöva användas vid anafylaxi i enlighet med rutinen:
Anafylaxi - Behandling vid allvarlig överkänslighetsreaktion hos vuxna - Rutin - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

I de fall där ansvarig sjuksköterska är osäker angående den medicinska bedömningen eller riktigheten i den tänkta medicineringen skall läkare kontaktas innan åtgärd vidtas.

Nedanstående ordinationer enligt generella direktiv är en rekommendation från läkemedelskommittén. För att dokumentet ska gälla som ordinationsunderlag för sjuksköterskor vid nedan nämnda arbetsplats ska det fastställas av medicinsk rådgivare på hälsocentralen.

Läkemedel för anafylaxiberedskap tillhandahålles av den som tillhandahåller vaccin. Hämtas samtidigt som vaccinet hämtas. Läkemedlen återlämnas om de ej använts.

Arbetsplats för detta dokument gäller: _____

Fastställt av läkare (namn och datum): _____

Ansvarig läkares hälsocentral: _____

Anafylaxi Vuxen

Vid anafylaxi – larma ambulans!
Adrenalin är det viktigaste läkemedlet. Ges tidigt och intramuskulärt i låret.
Antihistamin ges när patienten är stabiliserad.
Rutinmässig behandling med steroider vid akut anafylaxi rekommenderas inte.
Hastig uppresning av patienter med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall.

Läkemedel Styrka	**Läkemedels-form**	**Administrationssätt**	**Ordinerad dos**	**Maxdos per dygn Intervall mellan doser**	**Kontraindikation Kommentar**
Adrenalin 1mg/ml	Injektion	Intramuskulärt i låret	0,3–0,5 ml (0,3–0,5 mg) (Om autoinjektor ges dos 300 mikrogram)	Kan upprepas med 5–10 min intervall	OBS! Sänk sängens huvudända och höj fotändan. Larma ambulans!
Desloratadin = Caredin 2,5 mg	Munsönder-fallande tablett	Peroralt	4 tabletter (OBS, högre dos)	Ges när patienten är stabiliserad	

