

Hepatit A - Postexpositionsprofylax

Innehåll

Kontakta Smittskydd	1
Hepatit A-vaccin kan ges som postexpositionsprofylax till	1
Gammaglobulin ges som postexpositionsprofylax till	1
Registrerade Hepatit A vaccin	2

Kontakta Smittskydd

Kontakta alltid Smittskydd Gävleborg vid misstanke om akut hepatit A.

Postexpositionsprofylax ska ges snarast och senast 2 veckor efter smittotillfället. Profylax utgörs antingen av Hepatit A vaccin eller av gammaglobulin.

Profylax ges till personer som varit utsatta för smitta:

- Hushållskontakter.
- Partner.
- Förskolekontakter.
- Andra som kan ha smittats vid tex. mathantering.

Hepatit A-vaccin kan ges som postexpositionsprofylax till

- Personer från 1 – 40 års ålder som varit utsatta för smitta.
(Vaccin är ofta att föredra då gamma-globulin kan vara svårt att få fram.)

Gammaglobulin ges som postexpositionsprofylax till

- Barn yngre än 1 år.
- Vuxna > 40 år
- Gravida.
- Personer i alla åldrar
 - med kronisk leversjukdom
 - med nedsatt immunförsvar
- Kan ges i alla åldrar om hepatit A vaccin inte finns tillgängligt.

Vid immunbrist exempelvis vid behandling med TNF alfa hämmare ska gammaglobulin övervägas då vaccin ej har tillräcklig effekt. Profylaxen är **kostnadsfri för patienten** enligt smittskyddslagen.

Diskussion om vem som tar vaccinkostnaden får inte försena handläggningen. Ta upp frågan med tjänstgörande Smittskyddsläkare.

Personer som vaccineras får dock själva bekosta påfyllnadsdos, som bör ges efter 6–12 månader. Två doser krävs för ett långvarigt skydd mot hepatit A.

Registrerade Hepatit A vaccin

- Vaqta® är det vaccin som är upphandlat för Region Gävleborg
- Havrix® ej upphandlat vaccin i Region Gävleborg

Twinrix® (vaccin mot hepatit A+B) innehåller inte tillräcklig mängd inaktiverat hepatit A virus och kan därför inte användas som postexpositionsprofylax.

Däremot om man tidigare fått två eller fler doser med Twinrix® så har man skydd mot hepatit A.

| [Vaccin avtalade priser](#) – Läkemedelsenheten, rutin Region Gävleborg