

Provtagningsanvisning odling BAL/Skyddad borste - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Kvantitativ aerob och anaerob odling

Remiss	<p>Elektronisk remiss eller Remiss 2, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg</p> <p>Ange kliniska data och eventuell antibiotikabehandling på remissen.</p> <p>Vid misstanke om actinomykos, nocardios, brucellos eller tularemi ska detta alltid framgå på remissen.</p>
Provtagning	<p>Sterilt rör, artikelnummer i procedo: 1088617</p> <p><u>BAL</u> Med BAL avses följande provtagningsförfarande med bronkoskop:</p> <p>A. att 100-150 ml NaCl-lösning injiceras och aspireras i portioner om 20-50 ml. 1-10 ml vätska skickas för odling.</p> <p>B. att 10-20 ml NaCl-lösning injiceras och aspireras. (lågvolyms-BAL) 1-10 ml vätska skickas för odling.</p> <p>Om provtagningen görs på annat sätt ska detta noteras på remissen varpå kvantitativ odling ej utförs.</p> <p><u>Skyddad borste</u> Efter provtagning i samband med bronkoskopi förs borsten in i katetern som sedan dras ut ur bronkoskopet. Tvätta därefter kateterspetsen med sterilt vatten. För ut borsten och klipp ner den i ett sterilt rör med 1 ml steril koksalt.</p>
Förvaring/Transport	Transporteras omgående till laboratoriet, förvaras kylt i väntan på transport.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt

Svarstid	Preliminär svar: tidigast efter ett dygn Slut svar: tidigast efter två dygn
Akrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Odlingen är kvantitativ men vid förekomst av ordinär luftvägsflora anges ej kvantitet. Växt av luftvägspatogener rapporteras med resistensbestämning.
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om nedre luftvägsinfektion särskilt hos immunsupprimerade och svårt sjuka patienter.

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet