

# Rivastigmin kapslar och oral lösning

Informationsblad om läkemedel som innehåller rivastigmin.

## Läkemedelsnamn

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller samma verksamma ämne. Exempel på läkemedel som innehåller det verksamma ämnet rivastigmin är: **Exelon**, **Nimvastid** och **Prometax**.

## Hur verkar läkemedel som innehåller rivastigmin?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylcholin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

## Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar eller bromsar inte sjukdomen, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättrad förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättrad språklig förmåga. Även förmågan att klara dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten varierar mellan individer, varför regelbunden uppföljning görs för att bedöma om behandlingen är till nytta.

## Vilka biverkningar kan rivastigmin ge?

En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan vara illamående, kräkningar, lös avföring, nedsatt aptit eller yrsel. Som regel är dessa övergående. Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare eller sjuksköterska.

## Hur ska man ta läkemedlet?

Kapslar eller oral lösning med rivastigmin tas två gånger om dagen, morgon och kväll. Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär.

Kapslarna brukar gå lättare att svälja om du först tar en klunk vätska.

### **Kan man dricka alkohol när man tar rivastigmin?**

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och rivastigmin är inte specifikt studerad.

### **Vad gör man om man....**

#### **...glömt att ta en dos?**

Om du glömmer bort att ta en kapsel, vänta till nästa doseringstillfälle och ta då en vanlig dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer flera doser, eller om du ofta glömmer att använda dina läkemedel, kontakta din mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett eller medicinutdelning.

#### **...tagit dubbel dos?**

Hoppa över den nästa ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du obehag eller mår illa, kontakta läkare eller sjuksköterska.

### **Vem ska man prata med om man har några frågor?**

Tala med din behandlande läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan även vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

*Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Informationen är ett stöd och ersätter inte läkemedlets bipacksedel eller information från apotek. Vid frågor eller biverkningar, kontakta vården. Senast uppdaterad 02/2026.*