

Samvaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker - Rutin - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg

Titel: Samvaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker	Dokumentkategori: Rutin	Omfattning: Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg
Dokumentägare: Smittskyddsläkare	Dokumentansvarig: Administratör, smittskydd	Beslutsinstans: Smittskydd
Diarienummer: -		Datum för översyn: Se giltigt t o m

Innehåll

1.	Syfte och omfattning	2
2.	Innehåll	2
2.1.	Allmänt	2
2.2.	Beskrivning	2
3.	Kommunikation och implementering	3
4.	Medverkande och granskare	3

1. Syfte och omfattning

Denna rutin beskriver samvaccination hos vuxna mot covid-19, influensa och pneumokocker inom Hälso- och sjukvård Region Gävleborg. Syftet med rutinen är att uppnå en effektiv och patientsäker hantering där det säkerställs att vaccinet bibehåller sin kvalitet hela vägen fram till det administreras och där processer för ordination, iordningställande, vaccination och dokumentation finns fastställda och är kända i berörda verksamheter.

2. Innehåll

2.1. Allmänt

All information kring vaccinationer mot covid-19, influensa och pneumokocker publiceras på samverkanswebben. Här finns rutiner, blanketter och information om respektive vaccin.

2.2. Beskrivning

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive mRNA-vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna. Vaccin mot influensa, covid-19 (mRNA) och pneumokocker kan alltså ges i tid oberoende av varandra, förutsatt att patienten känner sig pigg och inte har pågående biverkningar från (eventuell) föregående dos. Vaccination med förstärkt influensavaccin och det proteinbaserade covid-19 vaccinet rekommenderas att ges vid olika tillfällen.

Om två eller flera vacciner administreras vid samma tillfälle bör dessa ges i olika extremiteter.

Vid en situation där vaccinatören överväger att ge två eller fler vacciner samtidigt bör de individuella konsekvenserna av ökade biverkningar för den vaccinerade beaktas. Detta är en individuell bedömning som är särskilt viktig vid vaccination av sköra personer och vid vaccination av gravida. Samtidig (eller inom en veckas) administration av flera vacciner kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. Detta skall alltid beaktas av vaccinator vid bedömning om eventuell samvaccination.

	Comirnaty	Fluarix	Fluad	Pneumovax	Prevenar 20	Bimervax	Capvaxive
Comirnaty	Ej aktuellt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Fluarix	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ja
Fluad	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ja
Pneumovax	Ja	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Prevenar 20	Ja	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Bimervax	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt
Capvaxive	Ej aktuellt	Ja	Ja	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt	Ej aktuellt

- Samtidig vaccination har inte visat någon negativ påverkan på vaccinationseffekten men vissa biverkningar kan öka, såsom ont i armen, feber eller muskelvärk.

3. Kommunikation och implementering

Regionens vaccinsamordnare ansvarar för att rutinen når vaccinatörer och ordinatorer i kommuner och hälsocentraler. Rutinen läggs på samverkanswebbens sida för [vaccinationer](#) och återfinns under respektive sjukdom.

4. Medverkande och granskare

Dokumentet är framtaget av vaccinsamordnaren, granskat av apotekare läkemedelsenheten och fastställt av smittskyddsläkaren.

Dokumentet får inte brytas ner på underliggande nivå utan samråd med dokumentansvarig.