

Aktuella områden för screening av multiresistenta bakterier

Patienter ska screenas för förekomst av MRSA, ESBL och VRE:

Inför inläggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård -exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats utan för Norden enligt nedan

- sjukhusvårdats utanför Norden senaste 6 månaderna
- erhållit avancerad poliklinisk vård (t.ex. såromläggning, dialys) utanför Norden senaste 6 månaderna
- om person i samma hushåll är bärare
- vårdad på sjukhus i Norden där det pågår smittspridning
- om patienten anlant som flykting till Sverige under 2015 eller senare

Patienter ska screenas för förekomst av VRE:

Inför inläggande sjukvård och vid avancerad poliklinisk sjukvård - exempelvis dialys, blodtransfusion, omläggning av vätskande sår.

Om de vårdats i Sverige från 1 juni 2019 och framåt vid:

- Danderyds sjukhus
- Geriatrikavdelning 30A vid Akademiska sjukhuset Uppsala

Om de vårdats i Sverige från 1 augusti 2019 och framåt vid:

- Universitetssjukhuset Örebro och Karlskoga lasarett
- Karolinska Solna infektionsavdelning

Vårdpersonal i patientnära vård ska före återgång i arbete screenas för MRSA

Om personalen

- vårdats på sjukhus utanför Norden under de senaste 6 månaderna *eller*
- arbetat på sjukhus utanför Norden under de senaste 6 månaderna

Provtagningsanvisningar

MRSA: Näsöppning, svalg, perineum *och* odling tas även om det finns:

- sår
- eksem
- skadad hud
- infarter
- katetrar
- eller annan riskfaktor

ESBL: Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

VRE: Pinnprov från faeces eller ändtarmen.

[Länk till Kliniskt Mikrobiologiskt laboratoriums sida för provtagnings-anvisningar.](#)

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet