

# Samvaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker, Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

## Innehåll

1. Syfte och omfattning .....	1
2. Allmänt .....	1
3. Ansvar och roller .....	1
4. Beskrivning .....	1
5. Plan för kommunikation och implementering .....	2
6. Dokumentinformation .....	2
7. Referenser .....	2

## 1. Syfte och omfattning

Denna rutin beskriver samvaccination hos vuxna mot covid-19, influensa och pneumokocker inom Hälso- och sjukvård Region Gävleborg. Syftet med rutinen är att uppnå en effektiv och patientsäker hantering där det säkerställs att vaccinet bibehåller sin kvalitet hela vägen fram till det administreras och där processer för ordination, iordningställande, vaccination och dokumentation finns fastställda och är kända i berörda verksamheter.

## 2. Allmänt

All information kring vaccinationer mot covid-19, influensa och pneumokocker publiceras på [samverkanswebben](#). Här finns rutiner, blanketter och information om respektive vaccin.

## 3. Ansvar och roller

Vaccinatörer och ordinatorer ansvarar för att nedanstående beskrivning följs.

## 4. Beskrivning

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot covid-19 och pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna. Vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker kan alltså ges i tid oberoende av varandra, förutsatt att patienten känner sig pigg och inte har pågående biverkningar från (eventuell) föregående dos. Observera tabell nedan gällande Bimervax.

Om två eller flera vacciner administreras vid samma tillfälle bör dessa ges i olika extremiteter.

Vid en situation där vaccinatören överväger att ge två eller fler vacciner samtidigt bör de individuella konsekvenserna av ökade biverkningar för den vaccinerade beaktas. Detta är en individuell bedömning som är särskilt viktig vid vaccination av sköra personer och vid vaccination av gravida. Samtidig (eller inom en veckas) administration av flera vacciner kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. Detta skall alltid beaktas av vaccinatör vid bedömning om eventuell samvaccination.

	Cominarty	Bimervax	Vaxigrip Tetra	Efluelda Tetra	Pneumovax	Prevenar 20
Cominarty	X	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Bimervax	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Vaxigrip Tetra	Ja	Nej	X	Ej aktuellt	Ja	Ja
Efluelda Tetra	Ja	Nej	Ej aktuellt	X	Ja	Ja
Pneumovax	Ja	Nej	Ja	Ja	X	X
Prevenar 20	Ja	Nej	Ja	Ja	X	X

- Samtidig vaccination har inte visat någon negativ påverkan på vaccinationseffekten men vissa biverkningar kan öka, såsom ont i armen, feber eller muskelvärk.

## 5. Plan för kommunikation och implementering

Regionens vaccinsamordnare ansvarar för att rutinen når vaccinatörer och ordinatorer i kommuner och hälsocentraler. Rutinen läggs på samverkanswebbens sida för [vaccinationer](#) och återfinns under respektive sjukdom.

## 6. Dokumentinformation

Dokumentet har tagits fram av Maria Larsson, Vaccinsamordnare, granskats av Jessica Eriksson, Läkemedelsenheten och fastställts av Shah Jalal, Smittskyddsläkare.

## 7. Referenser

Dokumentnamn	Plats
<a href="#">Informationsmaterial samt rutiner vid vaccination</a>	regiongavleborg.se
<a href="#">Covidvaccination - Lathund för dosintervall och vaccinsort.</a>	Platina