


## Provtagningsanvisning anti-Deamiderad Gliadin IgG - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från Journalsystem inom Gävleborg eller pappersremiss 3 serologi Region Gävleborg
Provtagning	5 mL, gul propp eller röd propp  För kapillärprov krävs minst 300 µL blod i mikrotainerör
Förvaring/transport	Hållbarhet 1 vecka i kylskåp Frys prov i -20 °C vid längre förvaring
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle
Referensintervall	< 7,0 kU/L
Svarstid	Helgfri måndag–fredag Analysen utförs 2 gånger/vecka.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	I undantagsfall
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/indikation	Celiaki är ett kroniskt tillstånd där intag av gluten leder till kronisk inflammation och skador på tunntarmslemhinnan.

	<p>Vid diagnostik av celiaki rekommenderas i första hand analys av transglutaminas-ak (IgA) (tTG-IgA).</p> <p>Antikroppar mot deaminerat gliadin har en lägre sensitivitet och specificitet för celiaki jämfört med antikroppar mot tTG-IgA. Analysen kan användas för kontroll vid dietbehandling.</p>
--	---

## Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-03-24	12	Lagt till revideringstabell och ändrat upprättare

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet