

Galantamin

Informationsblad om läkemedel som innehåller galantamin.

Läkemedelsnamn

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller samma verksamma ämne. På apoteket kan du därför få ett läkemedel med annat namn än det som står på receptet (exempelvis **Reminyl**), men med samma innehåll.

Hur verkar läkemedel som innehåller galantamin?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Vilken effekt kan man förvänta sig?

Läkemedlet botar eller bromsar inte sjukdomen, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättrad förmåga till inläring och problemlösning samt förbättrad språklig förmåga. Även förmågan att klara dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten varierar mellan individer, varför regelbunden uppföljning görs för att bedöma om behandlingen är till nytta.

Hur ska man ta läkemedel som innehåller galantamin?

Kapslarna är depotkapslar, vilket innebär att det verksamma ämnet frisätts långsamt i tarmen. Kapslarna ska därför sväljas hela och får inte tuggas eller krossas. Depotkapslar tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.

Det är bra att ta kapslarna tillsammans med mat för att minska risken för magbesvär. Kapslarna brukar gå lättare att svälja om du först tar en klunk vätska.

Vilka biverkningar kan galantamin ge?

En del personer får biverkningar av galantamin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan vara illamående, kräkningar, lös avföring och nedsatt aptit. Som regel är dessa övergående.

Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta läkare eller sjuksköterska.

Kan man dricka alkohol när man tar galantamin?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och galantamin är inte specifikt studerad.

Vad gör man om man....

...glömt att ta en dos?

Om du glömmer bort att ta en dos, vänta till nästa dag och ta din dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer flera doser eller ofta glömmer din medicin, kontakta din mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett eller medicinutdelning.

...tagit dubbel dos?

Hoppa över den nästa ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du obehag, kontakta läkare eller sjuksköterska.

Vem ska man prata med om man har några frågor?

Tala med din behandlande läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan även vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av Hälsostaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Informationen är ett stöd och ersätter inte läkemedlets bipacksedel eller information från apotek. Vid frågor eller biverkningar, kontakta vården. Senast uppdaterad 02/2026.