

Galantamin

Informationsblad om läkemedel som innehåller galantamin

LÄKEMEDELSNAMN

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt samma verksamma ämne. Galantamin heter till exempel även Reminyl.

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER GALANTAMIN?

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och förmedlar information.



VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?

Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDLET?

Kapslarna är utformade som depotkapslar, vilket innebär att det verksamma ämnet frisätts i långsam takt i tarmen. Därför ska kapslarna sväljas hela och får inte tuggas eller krossas. Depotkapslarna tas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje dag. Det är bra att ta kapslarna tillsammans med mat, för att minska eventuella magbesvär. Kapslarna brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk vätska.

VAD GÖR MAN OM MAN;

• GLÖMT ATT TA EN DOS?

Om du glömmer bort att ta en dos, vänta till nästa dag och ta din dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du glömmer flera doser, eller om du ofta glömmer bort att ta din medicin, kontakta din behandlande mottagning. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett och/eller medicinutdelning.

• TAGIT DUBBEL DOS?

Hoppa över den nästkommande ordinarie dosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du något obehag ska du kontakta läkare/sjuksköterska.

VILKA BIVERKNINGAR KAN GALANTAMIN GE?

En del personer får biverkningar av galantamin. Besvären varierar från person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös avföring och dålig aptit. Som regel är dessa biverkningar övergående.

Om du besväras av någon biverkning som inte går över, kontakta din läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR GALANTAMIN?

Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och galantamin är inte specifikt studerad.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA FRÅGOR?

Tala med din behandlande läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling. Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

Denna läkemedelsinformation är ursprungligen framtagen av HälsoStaden Ängelholms sjukhus, Enheten för Kognitiv Medicin. Den har modifierats av Minnesmottagningen i Gävleborg. Senaste revidering 09/2023.